

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

## ÉDITION GRANDES CULTURES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Rue Saint-Jean • B.P. 19 • 31131 BALMA CEDEX  
Tél. Standard : 61.24.70.70 - Technique : 61.24.70.33  
Abonnements : 61.24.70.30

Régisseur de Recettes  
D.R.A.F. "MIDI-PYRENEES"  
CCP : 8618-62 Y Toulouse  
I.S.S.N. : 0752-2053

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ABONNEMENT ANNUEL : 80 F

BULLETIN N° 5 DU 25 JUILLET 1992

### BULLETIN PROTECTION DU MAÏS SEMENCE édité avec la collaboration du SYNDICAT DE PRODUCTEURS DE MAÏS SEMENCE "ARMAGNAC-BIGORRE"

## MAÏS

### Situation

Extension des flétrissements liés à la première génération observés au cours des 15 derniers jours dans les parcelles mal protégées. L'insecte reste donc bien présent sur la région. La nymphose vient de commencer (5 %).

### Prévision

Le vol de seconde génération devrait débiter les premiers jours d'août ; une intensification est à prévoir à partir du 10 août.

### Préconisation

*Envisager les traitements de seconde génération la semaine du 10 au 15 août.*

## PYRALE

### Situation

La nymphose de l'insecte n'a pas encore commencé.  
Les niveaux d'infestation restent modérés dans l'ensemble des parcelles.

### Préconisation

*Toute intervention est actuellement inutile.*

## PUCERONS

### Situation

La régulation des populations de *Sitobion avenae* et *Metopolophium dirhodum* est intervenue comme prévu entre le 10 et le 15 juillet.

### Information

Une expérimentation conduite durant cette campagne, nous a permis de vérifier que dans les conditions de l'année (frais et humide), les traitements sésamie à l'aide de pyréthriinoïdes permettaient un bon contrôle de pucerons, les résultats ci-dessous correspondent à une notation de différents étages foliaires du maïs après traitement avec diverses spécialités aux doses homologuées sur pucerons des céréales.  
L'efficacité limitée du pirimor utilisé seul est due aux conditions climatiques.

notation pucerons du maïs j+6

